

היחידה לפרמקולוגיה קלינית  
ובית המרקחת מרכז רפואי "אסף הרופא" צריפין  
היחידה לפרמקולוגיה קלינית מרכז רפואי "קפלן" רחובות

על רקע חוסר האחידות הקיימת ברשימות התרופות האסורות לשימוש במטופלים חסרי האנזים G6PD, פורסמה על ידינו לאחרונה בעיתונות הרפואית סקירת ספרות מקיפה המתבססת על כל המחקרים, פרסומי פרשיות מקרה, ספרי רפואה מובילים וסקרי הרופאים שיצאו לאור ב-50 השנים האחרונות [Drug Safety 2010;33(9):713-726].

על סמך עבודה זו הוכנה רשימה מעודכנת של התרופות האסורות על חולים החסרים את האנזים G6PD.

להלן מסקנות סקירת הספרות:

## תרופות אסורות לשימוש במטופלים חסרי האנזים G6PD ובנשים המיניקות תינוקות חסרי האנזים:

Dapsone – Avlosulfon® (1)

Methylene Blue (2)

Nitrofurantoin – Macrochantin®, Uvamin® (3)

Phenazopyridine – Sedural® (4)

Primaquine – Primaquine® (5)

Rasburicase (6)

Toluidine Blue (7)

### **Trimethoprim/Sulfamethoxazole – Sulfatrim®, Diseptyl®, Resprim®, Septrin®**

אין התווית נגד לשימוש בתרופה בחולים חסרי האנזים G6PD במינון רגיל. עם זאת, לאור דיווחים על המוליזה בזמן טיפול במינון גבוה, רצוי להעדיף טיפול חלופי. בחולים עם מחלות ממאירות ו/או חסר חיסוני בהם נדרש מניעת זיהום על ידי *Pneumocystis carinii*, ניתן לשקול שימוש בתרופה תוך זהירות מתאימה.

תרופות אשר היו עד כה ברשימה והוצאו ממנה (כגון: *dipyron*, *chloramphenicol*, *aspirin*, ויטמין א, ועוד) – אפשר לתת לחולים חסרי האנזים G6PD במינון הרגיל המקובל.

אנו מבקשים לדווח על המוליזה המתרחשת על רקע שימוש בתרופה כלשהי למכון לייעוץ תרופתי "אסף-הרופא": פקס: 08-9779138, טלפון: 08-9779309.